



# La NEW HAMPSHIRE



Une race venue d'Amérique

# Origine

**Quand ?** : vers 1910 à partir de Rhode Island red

**Où ?** : USA - État de Rhode Island

**Ce qui est recherché ?**


Emplumage rapide, croissance rapide,  
précocité.

Et aussi : gros oeufs et bonne chair

**Homologation : USA**

*Standard of Perfection* en 1935

**Arrivée en Europe** : après la Seconde Guerre mondiale comme  
race économique.



## Buts de l'élevage

- **Bonne production de chair.**
- **Bonne production d'oeufs.**
- **Précocité.**
- **Robustesse,**
- **Rapidité de croissance,**
- **Grande dispersion de la population.**

## Aspect général

- Masse moyenne ; puissante mais élégante,
- Forme bien arrondie,
- Port moyennement élevé, large.



**Pourquoi ?**

## Les résultats

Cela donne : chair, œufs et bonnes éclosions



## Type

Toutes les caractéristiques de la New Hampshire doivent être réunies pour donner naissance à une forme harmonieuse

**La New Hampshire n'est pas :**

La Rhode Island « sèche »

La grosse Orpington

La Barnavelder, au port bas

La Langschan, haute sur pattes



**La New Hampshire est la New Hampshire**

## La tête

**De grandeur moyenne, plus aplatie qu'arrondie.**

**Sa grandeur doit être en harmonie avec le corps !**

Pas facile d'obtenir l'harmonie  
entre la crête, les barbillons et le  
bec



Le jugement :  
Harmonie  
Grandeur  
Forme  
Éléance



## Tête : les défauts

### Défauts :

Tête longue ou anguleuse – indices de maladie.

Chez le coq : tête efféminée.



## La crête

Simple, de grandeur moyenne, avec 5 ou 6 crétilons, lobe suivant la nuque, non déviée.

La crête doit être en harmonie avec la tête et les barbillons.

### Le jugement :

Grandeur ,Forme,  
Crétilons , Position  
du lobe, Nombre  
de crétilons.



## La tête : défauts

### Les défauts:

Crête trop grande ou trop petite, texture grossière.

Crête irrégulière. 2 ou 3 crétilons, double crétilon, excroissance, en dents de scie, crétilons filiformes.

**Lobe dévié.**



Sans commentaires



De longueur moyenne, lisse, sans plis.

Les barbillons doivent être en harmonie avec la tête et la crête.

Le jugement : Grandeur , Longueur , Forme , Texture.

Défauts : irréguliers, trop longs, trop petits ou fortement déformés.



**Oblongs, lisses, rouge vif.**

Le jugement :  
Couleur, Grandeur, Structure.

**Défaut** : Présence de blanc.



**Grands, orange à rouge, vifs.**

**Le jugement :**

Coloris, forme de la pupille.

**Défauts :**

Yeux de poisson  
(Élimination)

Yeux clairs :

Tenir compte de la  
période de ponte !



**Fort, de longueur moyenne.**

**Brun doré jaunâtre à corne, jaune chez la variété blanche.**

**Le jugement :**

Forme, Couleur. Grandeur.

**Défauts :**

Trop long, Bec fortement recourbé, Bec de perroquet (Élimination), Bec non fermé ou croisé (Élimination), Couleur trop claire (tenir compte de l'âge ou de la ponte).



Lisse, texture fine, rouge.

Le jugement : Couleur, texture.

### Défauts :


Blanc dans la face.

Face pâle (signe de mauvaise santé).

Texture grossière.



De longueur moyenne, large, profond, bien arrondi.  
Avec une poitrine pleine et large.





Le jugement :  
Forme du corps,  
de chaque côté ,  
Longueur,  
Profondeur,  
Largeur,  
Tenue,  
Musculature.  
Forme de  
l'abdomen (en  
particulier chez la  
poule)



Chez la poule

De longueur moyenne, large, profond, bien arrondi.  
Avec une poitrine pleine et large.



### Défauts :



Corps court, trop compact, triangulaire.  
Poitrine peu marquée chez la poule.



**Profonde, large, bien arrondie,  
Portée vers l'avant.**

**Le jugement :**

Forme de la poitrine : Large , Arrondie, profonde.  
Port et conformation.



### Les défauts :

Poitrine plate, petite poitrine, poitrine portée trop haut.



**De longueur moyenne, bien courbé,  
Le camail descendant jusqu'aux épaules.**

**Le jugement :**

Longueur et largeur, longueur et densité du camail.

**Défauts :**

Camail court, non terminé, peu fourni.



## Le dos et la selle

Dos de longueur moyenne, large,  
Légèrement arrondi, sans angle vers la queue.  
Selle large, arrondie sur les côtés, sans bouffant.



Le jugement :

Longueur, largeur, forme de la ligne  
du dos avec continuité avec la  
queue. Largeur de la selle.



## Le dos et la selle

### Défauts :

Dos plat et long, dos court. Ligne anguleuse à la selle.



**Arrondies et non saillantes.**

## Les épaules

**Le jugement : Large et arrondie.**

**Défauts :  
Épaules  
étroites ou trop  
saillantes.**



## Les ailes

De moyenne grandeur, bien fermées, serrées au corps.

Le jugement :

Position , Port, Extrémités.

Défauts :

Ailes portées bas, ailes pendantes, ailes en ciseaux.

La forme et la largeur des rémiges sont jugées avec la structure du plumage




## La queue

**De longueur moyenne , portée bien ouverte,  
Faucilles de longueur moyenne et larges,  
Tectrices larges, mais bien recouvrantes.**

**Le jugement :**


Angle de queue, Forme et longueur des faucilles,  
Largeur des tectrices.



## La queue

### Défauts:

Queue portée trop haut ou trop bas, faucilles trop longues ou trop courtes, queue trop ouverte, tectrices trop longues, faucilles ou tectrices trop courtes.



## Les cuisses, tarses et doigts

**Cuisses : bien visibles, musclées, de longueur moyenne.**  
**Tarses : droits, de longueur moyenne, lisses, jaunes.** **Doigts : droits et bien implantés.**

**Le jugement :** Hauteur et largeur.  
Cuisses visibles, longueur et musculature des cuisses.  
Longueur, couleur, épaisseur des tarses.  
Tarses lisses. Forme des doigts.

### Défauts :

Port trop bas ou trop enlevé,  
Port trop étroit.  
Tarses emplumés, de couleur trop claire, cuisses peu visibles.



## Le jugement :

Structure des plumes : larges (surtout rémiges et tectrices) et serrées au corps. Nombre de rémiges.

## Défauts :

Rémiges et tectrices étroites.

Bouffant à la selle et aux flancs. Filoplumes. Pas assez ou trop de rémiges.



## La poule

Identique au coq compte tenu des différences dues au sexe. Poitrine bien large, pleine et un peu relevée. Queue de longueur moyenne avec des tectrices larges, largement ouverte.

Le jugement :

Forme du corps : large, profond et long. Forme de la poitrine, de la queue . Attributs de la tête.



## La poule

### Défauts :

Poitrine peu développée, petite queue, port trop bas, trop de bouffant, tarse emplumés.

Tarses ou bec de couleur trop claire (attention : tenir compte de la période de ponte)



Dos trop plat ou trop court

Forme trop courte et trapue

Poitrine plate

Port trop relevé ou trop bas

Ossature trop grossière ou trop fine

Blanc dans les oreillons

## Par ordre d'importance

- Type
- Largeur
- Profondeur
- Ligne du dos
- Port
- Forme de la queue et de la poitrine
- Attributs de la tête



**!! Les 3 couleurs !!**

## La variété fauve acajou à queue noire

COQ : tête et camail brun doré ; dans la partie inférieure du camail quelques traces noires éventuellement cachées.

Selle un peu plus foncée que le camail, sans dessins noirs. Dos, épaules et couvertures des ailes brun châtain brillant.

**La différence de coloris entre le camail, la couverture des ailes et la selle doit être nette.**

La poitrine et le reste du corps brun doré un peu plus clair.



## La variété fauve acajou à queue noire

Rémiges primaire brun doré avec des dessins noirs aux barbes externes le long de la hampe, mais pas obligatoirement sur toute la longueur.

Rémiges secondaires brun doré avec dessins noirs aux barbes internes ;  
barbes externes brun doré pâle.




## La variété fauve acajou à queue noire

Textrices noires, avec de légers liserés bruns à l'extrémité

Grandes faucilles noir profond à reflets verts

Petites faucilles noires, petits liserés bruns souhaités


Le plumage du coq doit montrer des reflets brillants



## La variété fauve acajou à queue noire



## La variété fauve acajou à queue noire



## La variété blanche



Il existe aussi une variété fauve  
acajou à queue bleue